



TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E.M.Ağayev

9 iyul

2024-cü il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

SİNAFLAN xaricə istifadə üçün məlhəm
SYNAFLAN

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: flüosinolon asetonid

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 q məlhəmin tərkibində 0,25 mq flüosinolon asetonid (Flüosinolon) vardır.

Köməkçi maddələr: bərk parafin, duru parafin, metilparaben, yumşaq ağ parafin.

Təsviri

Açıq sarı rəngdən sarı rəngə qədər olan məlhəmdir.

Farmakoterapevtik qrupu

Yerli istifadə üçün qlükokortikosteroid.

ATC kodu: D07AC04.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Xaricə istifadə üçün qlükokortikosteroiddir. İltihab əleyhinə, allergiya əleyhinə, antiekssudativ və qaşınma əleyhinə təsirə malikdir. İltihabi dəri reaksiyalarının təzahürünü azaldır və aradan qaldırır.

Farmakokinetikası

Dəridən sorulduqdan sonra plazma zülalları ilə birləşir, qeyri-aktiv metabolitlərin yaranması ilə qaraciyərdə metabolizmə uğrayır. Bir qayda olaraq böyrəklər vasitəsilə xaric olunur.

İstifadəsinə göstərişlər

Ekzema, atopik dermatit, sadə xroniki dəmrov (məhdudlaşmış neyrodermit), toksidermiya, sadə allergik dermatit, seboreyalı dermatit, dəri qaşınması, övrə, qoturluq, bişməcə, multiformalı ekssudativ eritema, psoriaz (ekssudativ forma); qırmızı yastı dəmrov, diskoid qırmızı qurdeşənəyi, əl sümüklərinin dishidrozu, xarici otit, I dərəcəli yanıqlar, həşərat dişləməsi.

Əks göstərişlər

Dərman vasitəsinin komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq; dərinin bakterial, virus, göbələk xəstəlikləri – piodermiya, suçiçəyi, herpes, aktinomikoz, blastomikoz, sporotrixoz; sifilisin dəri təzahürləri, dəri vərəmi, bez səpgisi, çəhrayı sızanaqlar, yayılmış psoriatik səpgi (kiç), anogenital qaşınma; venaların varikoz genişlənməsilə əlaqədar ayağın trofik yaraları, mədə-bağırsaq traktının eroziv-xoralı zədələnməsi, applikasiya sahələrində yarananmalar; dəri xərçəngi, nevus, ateroma, melanoma, hemangioma, ksantoma, sarkoma; hamiləlik və laktasiya dövrü, uşaq dövrü (2 yaşa qədər).

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Ehtiyatla



Qızlarda cinsi yetişkənlik dövründə ehtiyatla istifadə olunur.

Dərinin çox da böyük olmayan sahələrində qısa kurslarla istifadə olunur. Dərman vasitəsini üzə sürtmək olmaz. Dərman vasitəsinin gözə düşməsindən çəkinmək lazımdır. Uşaqlarda istifadə müddəti 5 gündən artıq olmamalıdır. Müalicə müddətində geyim rahat və boş olmalıdır. Adi və ya çəhrayı sızanaqları olan xəstələrdə müalicə fonunda xəstəliyin ağırlaşması mümkündür. Yerli infeksiyon ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün antimikrob dərman vasitələri ilə birgə təyin etmək lazımdır.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Mikrob əleyhinə dərman vasitələri ilə təyin oluna bilər. Hipotenziv, diuretik, antiaritmik dərman vasitələrinin, kalium preparatlarının aktivliyini azaldır.

Diuretik dərman vasitələri (kaliumqoruyuculardan başqa) hipokaliemiyanın inkişaf riskini artırır.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Əks göstərişdir.

Nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri
Təsir etmir.

İstifadə qaydası və dozası

Xaricə istifadə olunur. Əvvəlcədən antiseptik məhlulla isladılmış tamponla zədələnmiş dəri sahəsi silinir və gündə 2-4 dəfə dəri səthinə çəkilir. Vacib olan halda zədələnmiş sahənin səthinə 3-4 gün müddətində okklyuzion sarğı qoyulur. Sarğının altında gün ərzində 2 q-dan artıq məlhəm sürtmək olmaz.

Müalicənin müddəti xəstəliyin xarakterindən asılıdır və 5-10 gün təşkil edir, xəstəliyin uzunmüddətli gedişində isə 25 günə qədər davam edir.

Məlhəm istifadəsinə dermatozların quru formalarında üstünlük verilir.

Əlavə təsirləri

Dərinin ikincili infeksiyon zədələnmələrini və həmin sahələrdə atrofik dəyişikliklərin (yağlı, dəri qaşınması, dəri quruluğu, steroid sızanaqlar, follikulit) inkişafı mümkündür. Uzun müddətli istifadəsi zamanı – hipertrixoz, alopesiya (xüsusilə qadınlarda), ikincili immunodefisit (xroniki infeksiyon xəstəliklərin ağırlaşması, infeksiyon prosesin yayılması, opportunistik infeksiyaların inkişafı); dəri atrofiyası, yerli hirsutizm, teleangioektaziyalar, purpura, pigmentasiya pozulmaları. Geniş dəri səthinə sürtdükdə sistem təzahürlərin olması mümkündür (qastrit, mədənin "steroid" xorası, böyrəküstü vəzinin çatışmazlığı, İtsenko-Kuşenq sindromu, "steroid" şəkərli diabet, reparativ proseslərin ləngiməsi).

Doza həddinin aşılması

Simptomları: qaşınma, dərman vasitəsinin istifadə nəhiyəsində yağlı, hiperqlikemiya, qlükozuriya, İtsenko-Kuşenq sindromu.

Müalicəsi: dərman vasitəsinin tədricən dayandırılması fonunda simptomatik müalicə aparılır.

Buraxılış forması

Xaricə istifadə üçün 0,025% məlhəm.

10 q və ya 15 q məlhəm alüminium və ya polietilen laminatlı tubda. 1 tub içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

30°C temperaturdan yüksək olmayan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

4 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı/İstehlakçıların iradlarını qəbul edən təşkilat

Medifarco Pharmaceutical JSC, Vietnam.

08 Nguyen Truong to street-Phuoc Vinh ward-Hue city, Vietnam.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

Ukrfarmexport LLC, Ukraine.

02225, Kyiv, Saburova 19, house 3, Ukraine.

