

TƏSDİQ EDİLMİSDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E. M. Ağayev

“20” aprel 2020-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

PROSPAN® şərbət
PROSPAN®

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 ml şərbətin tərkibində 7 mq sarmaşıq yarpaqlarının quru ekstraktı [(5-7,5):1], eksragent: etanol 30% vardır.

Köməkçi maddələr: təmizlənmiş su, kalium sorbat, susuz limon turşusu, ksantan kitrası, 70 %-li sorbitol məhlulu (kristallaşdırılmış), albalı ətirləyicisi (2,5 ml şərbətin tərkibində 0,963 q sorbitol = 0,08 çörək vahidi).

Təsviri

Bir qədər bulanıq, xoşagələn meyvə dadlı və albalı ətirli, qonur rəngli şərbət.

Farmakoterapevtik qrupu

Bəlgəmgətirici preparatlar.

ATC kodu: R05CA.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Prospan® bitki mənşəli preparatdır. Tərkibində saponinlər, triterpenoidlər, flavonoidlər var. Bəlgəmgətirici, öskürəkəleyhinə və spazmolitik təsir göstərir. Bəlgəmin özlütlüyünü aşağı salır və xaricolmasını asanlaşdırır. Mikrobəleyhinə aktivliyə malikdir.

İstifadəsinə göstərişlər

Yuxarı tənəffüs yollarının və ağciyərlərin iltihabi xəstəliklərinin kompleks müalicəsində simptomatik vasitə qismində.

Əks göstərişlər

- Preparatın tərkibində olan aktiv inqradiyentə və ya hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq;
- fruktozaya qarşı dözümsüzlük.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

2 yaşa qədər uşaqlara Prospan® öskürəkəleyhinə şərbəti ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. Prospan® öskürəkəleyhinə şərbətin tərkibində spirt, şəkər və rəngləyicilər yoxdur. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən pasiyentlər nəzərə almalıdırlar ki, preparatın 2,5 ml məhlulunun tərkibində 0,963 q sorbitol vardır ki, bu da 0,08 ÇV-ə müvafiqdir.

Terapevtik effektiv sarmaşıq ekstraktının çəkilməsi üçün adsorbent şəklində 30 həcm % etanol istifadə olunur ki, gələcəkdə qurudulma prosesində ekstraktın tərkibindən tamamilə xaric olunur. Lakin, qurudulma prosesində, ekstraktın tərkibindən tamamilə xaric olunur.

Diqqət!

Preparatın tərkibində sarmaşığı ekstraktının olmasını nəzərə alaraq, saxlanma müddətində mayenin yüngül bulanması və dadının bir qədər dəyişməsi müşahidə oluna bilər ki, bunun da preparatın terapevtik effektivliyinə heç bir təsiri yoxdur.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Müəyyən edilməmişdir.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Preparatın hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsinin təhlükəsizliyi barədə kifayət qədər məlumatın olmamasını nəzərə alaraq, göstərilən pasiyent qrupunda preparatı istifadə etmək tövsiyə olunmur.

Nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Təsir göstərmir.

İstifadə qaydası və dozası

1 yaşa qədər uşaqlara gündə 2 dəfə 2,5 ml; 1 yaşdan 5 yaşa qədər uşaqlara gündə 3 dəfə 2,5 ml; 6 yaşdan 9 yaşa qədər uşaqlara gündə 3 dəfə 5 ml; böyüklərə və 10 yaşdan yuxarı uşaqlara gündə 3 dəfə 5-7,5 ml – preparatı əlavə olunan, ölçü qapağından istifadə edərək, qəbul etmək lazımdır.

İstifadə etməzdən əvvəl hər dəfə flakonu yaxşı çalxalamaq lazımdır.

İstifadə etdikdən sonra hər dəfə flakonu kəpək bağlamaq lazımdır!

Preparatın istifadəsinin davam etmə müddəti

Müalicə kursu 1 həftə təşkil etməlidir.

Terapevtik effektivliyin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə, xəstəliyin simptomları aradan qalxdıqdan sonra belə, müalicəni daha 2-3 gün müddətində davam etdirmək tövsiyə olunur.

Əlavə təsirləri

- Nadir hallarda, ürəkbulanma, qusma və diareya kimi mədə-bağırsaq simptomları və tərkibində sorbitolun olması ilə əlaqəli, işlədici effekt meydana çıxma bilər;

- çox nadir hallarda, təngnəfəslik, ödem, dərinin qızarması və ya qaşınma kimi allergik reaksiyalar meydana çıxma bilər;

- həssas pasiyentlərdə tezlik məlum deyil.

Doza həddinin aşılması

Tövsiyə olunan sutkalıq dozanı aşmaq olmaz. Preparatın, sutkalıq dozadan üç qat yüksək dozalarda daxilə qəbul edilməsi, ürəkbulanmanın, qusmanın və diareyanın meydana çıxmasına səbəb ola bilər.

Doza həddinin aşılmasını simptomatik müalicə etmək lazımdır.

Buraxılış forması

100 ml, flakonda. 1 flakon, ölçü qapağı və içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25° C-dən yuxarı olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Flakon açıldıqdan sonra preparatın saxlanılma müddəti 6 aydır.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

İstehsalçı

“Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG”.

Ünvan

Xersbergstrasse 3, 61138 Nidderdorfelden, Almaniya.